

醫心方卷第九

從五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿禰康賴撰

治欬嗽方第一

六子
永東三音

治小氣方第四

治痰飲方第七

治宿食不消方第十

治喘息方第二

工子
充安及

治氣壅方第五

於結及胃癰也

治癰食方第八

因癰食不消也

治寒食不食方第十一

治短氣方第三

治黃疸方第六

毛子
下丁又ヤテ

治胃反吐食方第九

毛子
下

治上熱下冷不食方第十二

而痛甚見於山五龍之也五龍之也五龍之也五龍之也

不已則胃受之胃受之狀欬而嘔其則長出肝欬不已

則膽受之膽受之狀嘔膽汁時欬不已大腸受之太腸欬

之狀欬而遺屎心欬不已則小腸受之小腸欬之狀欬而失氣

者與欬俱腎欬不已膀胱受之膀胱欬之狀欬而遺尿久欬

於肺使人多涕唾而面浮腫氣逆

千金方云問云欬病有十何謂師曰有風欬有寒欬有支

欬有肝欬有心欬有脾欬有肺欬有腎欬有膽欬有

厥陰欬問曰早欬之語目欬言不證以何為異師曰

欬語目欬言不得竟謂之風欬欬冷食寒日之而

欬謂之寒欬心下腎滿欬則引痛其脈又遲謂之

支欬引脇下痛謂之肝欬而吐血引手少陰謂

之心欬如涎出漬沫下引少腹謂之脾欬引頸項

而唾涎沫謂之肺欬而耳無所聞引腰脊謂之腎欬

而引口中頭痛口苦謂之膽欬而引舌本謂之厥

陰欬

傳陳方云欬欬要粘而如絲欬要清澄如水腎門

方云夫酒客欬者其人必吐血此為坐極飲過度所致難療

推要方云此病有數種有冷熱欬有肺萎欬有肺癰

欬有水氣欬若有本性非熱遇諸冷緣而得欬觸冷

便發熱即可此是冷欬也若有本性非冷遇諸熱緣

而得欬觸熱便發遇冷即可此是熱欬也若本性寒

又久熱將息更劇冷將息無効每唾無多濃痰

但唾白而稠物是細小泥沫此是肺萎嗽也若本性

冷熱將息無効每唾所出時是濃痰如膠中膿或寒

冷熱將息無効每唾所出時是濃痰如膠中膿或寒

冷熱將息無効每唾所出時是濃痰如膠中膿或寒

冷熱將息無効每唾所出時是濃痰如膠中膿或寒

冷熱將息無効每唾所出時是濃痰如膠中膿或寒

推要方云此病有數種有冷熱（欬）有肺萎（賴）有肺癰

嗽有水氣（賴）若有本性非熱遇諸冷緣而得（賴）觸冷

便發熱（遇）即可此是冷熱也若有本性非冷遇諸熱緣

而得（賴）觸熱便發遇冷即可此是熱熱也若有本性發熱

又久熱將息更劇冷將息無効每唾無多濃淡（淡）

但唾白而稠惣是細小泥沫此是肺萎嗽也若有本性

冷熱將息無効每賴所出時是濃淡如膿（中膿或寒）

或熱此是肺癰熱也若有非冷熱非經久患賴上氣喘

息腹滿悶甚者頭面有氣過久重者身體皆腫此是水

氣熱也葛氏方云上氣喘賴肩息不得卧手足逆冷

及面浮腫者死僧深方紫菀丸治咳上氣喘息多唾

方紫菀（一名黃白）細辛（一名橘皮）干薑（各三兩）各五物

丸如梧子三九先食服日三又方如櫻桃大含丸稍咽其

汁日三新久咳晝夜不得卧咽水雞聲欬死者治之甚良

今案者要方為散（白飲服一方寸匕）錄驗方小紫菀丸治上氣夜咳逆多濁（今案）

方干薑二兩（一名橘皮）細辛二兩紫菀三兩

類冬花二兩附子二兩凡六物下篩蜜和丸如梧子

先食服五九日二（今案）

大紫菀丸治上氣欬逆方紫菀二兩五味子二兩

橘皮二兩（一名橘皮）香豉二兩干薑二兩桂心二兩杏人二兩

細辛二兩甘草二兩（一名橘皮）食茱萸二兩

凡十一物搗篩蜜和丸如梧子一服五九日二夜冷一丸如杏

核大咽汁晝更含（今案）並祖方治上氣咳東杏人丸方

杏人一升干薑二兩細辛二兩紫菀二兩桂心二兩

搗下篩杏人別如脂合和以蜜丸服如棗核一枚日三廣

濟方療咽喉乾欬賴語無聲桂心散方

糖皮二兩 香豉二兩 干薑二兩 桂心二兩 杏仁二兩

細辛二兩 甘草二兩 干薑二兩 附子二兩 食茱萸二兩

凡十一物 鵝薤蜜和丸如梧子一服五九日二夜冷一丸如杏

核大咽汁畫更含 垂祖方治上氣咳東杏仁丸方

杏人一升 干薑二兩 細辛二兩 紫菀二兩 桂心二兩

鵝下薤杏人別如脂合和以蜜丸服如棗核一枚日三廣

渚方療咽喉乾燥欬賴語無聲桂心散方

桂心六兩 杏人三兩 檮薤以綿裹一乘大含細咽汁日

三夜二忌生葱油膩 乾薑二兩 附子一兩 桂心一兩 乾東花二兩

紫菀一兩 乾薑一兩 附子一兩 桂心一兩 乾東花二兩

細辛一兩 凡六物治獲和蜜丸 如小豆先食以二丸著牙

上稍目日弄不知稍進 又云授杯湯治欬上氣胸中寒

冷不能得食飲卧不安床牽繩而起咽中如水鷄聲方

乾東花二兩 細辛一兩 紫菀二兩 甘草二兩 桂心二兩 麻黃

五味半升 杏人一枚半 反半升 桂心二兩 麻黃

寒溫再服溫卧汗出即愈 三兩杏人百枚凡三物切以

水六升煮取二升 五合未食久三服

小品方治欬嗽上氣呼吸攀繩肩息欲死霞杯湯方

麻黃四兩 甘草二兩 干薑二兩 桂肉二兩 貝母二兩

凡五物以水八升煮取二升再服即愈 今案范汪云此方治男兒四歲極喘已多飲水得

上氣喘急欲死服之與五葉湯不差苗與合此霞林 又云汶雪

湯治上氣不得息卧喉中如水鷄聲氣欲絕方麻黃湯

細辛二兩 五味子半升 干薑四兩 反半升 桂心二兩 凡六物

以水一斗煮取三升分服一升授杯即得卧一名授杯湯令

得汗多毒不得眠汗者一服消息後服 今案經心方云麻黃湯

得汗多毒不得眠汗者一服消息後服 五葉半升桂心三兩杏人

見母 麻黃湯 甘草二兩 干薑二兩 杏仁五十枚 今案范汪云 凡五物以水八升煮取三升并服即愈 男兒四歲極寒已多飲水得

上氣喘急欲死服之與五葉湯不寒苗與此覆林 湯兒不能飲母稍念之一夜至明盡得愈 又云汶雪

湯治上氣不得息卧喉中如火雞聲氣欲絕方麻黃湯 細辛二兩 五味子半升 干薑四兩 半夏四兩 桂心二兩 凡六物

以水一斗煮取三升分服一升投杯即得卧一名投杯湯令 得汗多毒不得眠汗者一服消息後服 今案經心方云麻黃湯

三兩 細辛三兩 生薑兩半 半夏四兩 七物以水 一斗煮取三升分三服乘可立愈 今案漸加

欬者必致吐血坐極饑過多所致厚朴大黃湯主之厚朴 一尺大黃六兩 枳實四兩 三味水五升煮取二升分再服之

本草云欬逆厥髓以酒服之甚良 又方鴛鴦酒和 三合服之白三 又方食鯉魚肉也

孟詵食經云 療卒咳末方 梨一顆剉作五孔每孔 中內一粒以通果棧於灰中燒令極乾出停冷割食

之 今案樞要方梨七果取汁白錫一兩 又方梨去核內蘗蜜麵 裹燒令乾食之太良 又方割梨肉於蘗蘗中煎之停冷

食之 今案朱肱醫方食經云凡用梨治 食之 實皆須待冷食之與食及成類 葛氏方治卒得欬末方

皂莢 干薑 桂心 分小枳丸服三九日三 又方生薑汁百部汁 和薑服二合 集驗方治忽果氣束奔喘生卧不得并

喉裏聲氣欲絕方 麻黃三兩 杏仁四兩 干薑 紫胡四兩 橘皮二兩 切以水六升煮取三升半

分三服 張仲景方治廿年欬太素丸方 大棗百枚 杏人 百枚 欬百枚 凡三物豉杏人枳令相得乃內棗枳令乾

和調丸如棗核一丸含之稍咽汁日二漸增之常用良 者此方治廿年咳東方 細辛紫莞 麻黃 甘草 干薑

五味為散白飲服一方寸匕日三 各四

五

六

七

八

九

十

十一

十二

十三

十四

紫二兩 紫胡四兩 橘皮二兩 切以水六升煮取二升半

張仲景方治卅年欬大棗丸方 大棗百枚 杏人

百枚 欬百枚 凡三物炙杏人鳩令相得乃內棗鳩令乾

和調丸如棗核一九含之稍咽汁日二漸增之常用良

者要方治卅年欬東方 細辛紫莞 麻黃甘草干薑

五味為散白飲服一方寸匕日三

効驗方類冬花今丸治卅年欬上氣欬逆面腫方杏人

三升 干薑三兩 甘草二兩 乾冬

花二兩 凡六物治下肺以蜜和丸如梧子先食服三九日三

僧深方治新久欬花煎方花煎二兩 乾薑二兩

白蜜二升 凡三物內於蜜中微火煎服如棗核一枚日三

董欬凍法 錄鈴方治久欬動法 蠟紙一張熟艾薄

布遍紙上動黃末一兩 欬凍末二升 前遍布艾上著一

華筒卷之寸列以繩繫之燒下頭欬烟取三寸烟亦

可吐咽欬計寒欬盡刮一百日斷 壺及酢 今案本草權

千食方治欬黃法 細熟艾薄 布紙上廣四寸復以黃

末薄布艾上欬令調以荻杖如紙長卷之截作十枚先

以燒紙下去欬烟從孔出口取烟之取法心明日復重作

日餘者後日復重之三日心自然差得食白糜餘皆禁之

灸欬凍法

僧深方云灸通兩乳下黑白密際灸百壯 即日愈

又方以繩當乳 圍周身令前後平正當乳脊

骨解中灸之九十壯 又方橫度口中析繩從脊灸繩兩

邊灸八十壯三百報畢 又方從大椎數下行第五節下

第六節上穴間中一處灸隨年壯并治上氣秘方 小品方云

灸欬凍法

日餘者後日復薰之三日必自然差得食白糜餘皆禁之

僧深方云灸通乳下黑白密際文百壯即日愈

又方以繩當乳^{方同}圍周身令前後手正當乳脊

骨解中灸之九十壯又方橫度口中析繩從脊灸繩兩

邊灸八十壯三百報畢又方從大椎數下行第五節下

第六節上穴間中一處灸隨年壯并治上氣秘方小品方云

灸肩井穴百壯在肩上陷解中大骨前又方灸大柁穴

隨年壯在項第一椎下兩旁各一寸半陷者中又方灸

肺愈隨年壯在第三椎下兩旁各一寸半又方灸風門熱

府穴百壯在第二椎下兩旁各一寸半又方灸天突

穴五十壯在結喉下五寸宛中又方灸^{在紫宮}聖堂穴百壯在紫宮

下一寸六分又方灸^{在玉堂}中穴五十壯在玉堂下一寸六分兩乳間陷者

中又方灸雲門穴五十壯在巨骨下氣戶兩旁各一寸陷者中

橫去旋旁^機六寸又方灸中府穴五十壯肺募也在雲門下一寸

又方灸巨闕穴五十壯在鳩尾穴下五分又方灸期門穴五十

壯在者巨闕五寸奉臂取之^{金匱之}又方灸^{在旋機旁}輸府穴在旋機旁

各二寸又方灸中穴在輸府下一寸六分又方灸氣戶穴在

去旋機旁各四寸

葛氏方云度手母指中折以度心下灸三壯即差

治喘息方第二

病源論云肺主氣耶垂於肺則胎脹則肺管不利也則

氣道溢故氣上喘逆鳥息不通也葛氏方治平上氣

鳥息便欬飽方 搗蓬莖飲汁一升許立愈又方未人恭服

方寸匕日三又方桑根白皮細切三升生薑切半升吳茱萸

半升酒五升合煮三沸去滓盡服之入口則氣下此千金秘

更取五分
為鳩尾
穴下
骨下

治喘息方第二

病源論云肺主氣耶垂於肺則胎脹則肺管不利也則

氣道溢故氣上喘逆鳥息不通也葛氏方治平上氣

鳥息便欬飽方 搗蓬莖飲汁一升許三愈又方未人參服

方可日三又方桑根白皮細切三升生薑切半升吳茱萸

半升酒五升合煮三沸去滓盡服之八口則氣下此千金秘

方極要方療上氣之逆滿喘急不通呼吸欬死救命湯方

麻黃八兩 甘草四兩 大棗卅枚 夜干如博子三枚右以井

花水一斗煮麻黃并沸內餘藥煮取四升分四服入口即愈

醫門方治上氣喘急不得卧身面腫小便澀方 高麗

一兩 大棗卅枚 水三升煮取一升內亭歷煮五六沸

頓服微利老 効驗方遊氣湯治上氣一服元常緩

急不足不得飲食不得眠方 生薑八兩 厚朴四兩 人參二兩

茯苓四兩 桂心五兩 半夏一升 枳實子五枚 甘草二兩

黃芩三兩 凡九物切以水一斗煮取四升服七合日三

錄驗方大棗湯治上氣胃寒咽中如冰雞聲方

欬冬花卅枚 細辛四兩 桂心四兩 麻黃四兩 大棗廿枚 甘草四兩

杏仁卅枚 紫菀四兩 生薑十兩 半夏三升 十味以

水八斗煮取二斗頓服卧令汗食糜粥數日餘皆禁便愈

新錄方治上氣喉中水雞鳴方 桑根白皮一升生薑合

皮切二升以水四斗煮取一斗六分二服又方冷水漬之溫易之

又云上氣身面浮腫小便澀喘急不得卧方 高麗子十八 杏仁

四升 大棗肉五升 三物合煮三四升可丸飲服如梧子丸日二

加至十九以小便為度此方大安穩兼去水腫滿者又方以桑根

汁一斗煮赤小豆三升豆熟散豆飲汁又方大豆三升以水一斗

新錄方治上氣喉中水雞鳴方 桑根白皮一升生薑合

皮切一升以水四升煮取一升六分二服 又方冷水漬之溫易之

又云上氣身面浮腫小便澀澀息不得卧方 高麗子十八 杏仁

只 大棗肉五分 三物合煮三四升可丸飲服如梧子丸 又方

加至十九以小便為度此方大安穩兼去水腫滿者 又方以桑根

汁一斗煮赤小豆三升豆熟散豆飲汁 又方大豆三升以水一斗

煮取五升去滓內桑根白皮切一升煮取一升六分二服腫煩

消當利三行 又方以水一斗研麻子三升取煮赤小豆三

升豆熟散豆飲汁 又云之氣喘急方 桃人杏皮一升搗為

泥以酒若湯服之

治短氣方第三

病源論云短氣者平人无寒熱短氣不足以息者體實也實

則氣盛則氣逆不通故短氣也又肺虛則少氣不足也

令短氣則其人氣微常如少氣不足以呼吸也

僧深方治短氣欲絕不足以息煩燒養氣心煩竹根湯方

竹根一斤麥門冬一升甘草二兩大棗十枚粳米一升小麥一升

凡六物水一斗煮麥米熟去之內藥煮取二升七合服八合日三

不能飲以綿滴口中 醫門方治胸中痞塞短氣喘者

或腹急痛方 伏苓四兩 甘草二兩 半夏三兩

生薑三兩 杏仁百顆 水七升煮取二升半去滓分溫三服

相去八九里泄氣寒若氣不下加大黃檳榔人取利為佳

千金方治短氣不得語方 艾子二十七枚豉七合 水二升煮豉

取一升半去豉內艾子煮取八合服半升又云平短氣者方

鳩苴取汁服一升立愈 又云冷熱短方 枳五兩 縮袋咸

酒一升漬三七日服之任性

或患急痛方

伏苓四兩

甘草二兩

半夏三兩

生薑三兩 杏仁百顆

水七升煮取二升半去滓分溫三服

相去八九里泄氣寒若氣不下加大黃檳榔人取利為佳

千金方治短氣不得語方 艾子二十七枚豉七合 水二升煮豉

取一升半去豉內艾子煮取八合服半升又云平短氣者方

枳實取汁服一升立愈 又云冷熱短方 枳五兩 縮袋盛

酒一升漬三七日服之任性

治少氣方第四

病源論云少氣者此由藏氣不足故也肺主氣而通呼吸藏

氣不足呼吸微弱而少氣也胸痛少氣者水在藏府之故也

水者陰氣也陰氣在內故少氣也 廣濟方療腹冷氣不

能食及少氣調中丸方 人參五兩 伏苓五兩 甘草五兩

白朮五兩 干薑四兩 枳實蜜和為丸空腹溫酒服如梧子

廿九日二夜一有益盡更合不飲酒煮大棗飲下不利忌

海藻桃米酢 千金方治之氣方 為杞菜二兩 生薑

二兩以水三升煮取一升頓服 葛氏方治卒之氣不復

報肩息方 干薑三升艾咀以酒一升漬之服一升日三

又方度手母指折度心下灸三壯即差 又方麻黃三兩

先以水五升煮一沸去沫乃內甘草二兩杏仁六十枚煮

取二升半三服

治氣壅方第五

病源論云氣壅由陰陽不和藏氣不理寒氣填於胸

掌故氣有阻塞不通而謂之氣壅 令人喘悸胃背痛

也又云壅者一日氣壅二日憂壅三日食壅四日勞壅五日

思壅雖有五名皆由陰陽不和三焦障絕津液不行

憂患真怒所主所主所以謂之五壅者壅塞不通也

治氣壅方第五

病原論云氣壅由陰陽不和藏氣不理寒氣填於胸
掌故氣有咽塞不通而謂之氣壅令人喘悸胃背痛
也又云壅者一日氣壅二日憂壅三日食壅四日勞壅五日

思壅雅有五名皆由陰陽不和三焦障絕津液不行

憂患真怒所生所生所以謂之五壅者壅塞不通也

新錄方治氣壅胸塞不達方 水脹壅末一大匙又方含

咽羨酒取老心酢之得又方蘓蜜合桑令相得細之含咽

之又方鳩韭取汁脹五合又方灸臍中穴又方灸第五

椎又灸內踝上三寸

集驗方通氣壅湯方半夏八兩桂心三兩生薑八兩

凡三兩物以水八升煮取三升服半升日二

千金方治壅氣不逆永不得食方杏仁三兩桂心三兩

二味丸如棗核稍咽之臨食先含弥佳

治責氣方第六

病原論云夫責氣者腎之積氣也起於發怒思憂患所起

若驚恐則傷神心藏神也憂思則傷志腎藏志也神志傷

動氣積於腎而氣上下遊走如狂之責故云責氣其氣

乘心若心中踊如車所發如人所恐五藏不安食飲輒逆

氣滿胸中狂癡不定妄言見此發驚恐責氣之狀也若氣

滿文心下煩亂不聞人聲休作有時乍暴劇短

氣手足厥逆內煩結痛溫欲區此憂思責氣之狀也

醫門方云論曰奔狂病者從少腹起上衝喉咽發作時欲

死皆從驚得之療奔狂氣方

生葛根升甘李根白皮切升升水九升煮三升分溫三服

氣滿胸中狂癡不定妄言見妄此發爲忘真我之狀也若氣

氣手乏厥逆内煩結痛温熱不甚也欬カ嘔カ此憂思カ勞傷カ之狀也

死皆從驚得之療奔狂氣方

相去八九里ハカリ療奔北氣在心胸中不下ハカリ艾滿者方生薑

水七升，煮取二升，^半溫三服，相去八九里。又云：奔豚法。

是也。隨年灸之。
小品方云：師曰：病有奔，
有吐，有膿，有發，有怖。

人氣如狂奔氣息喘迫上逆之狀也傷方用贖猪者謂

葛根又作藤湯方子路仰葛根八兩干者生李根升人參去皮三兩木

甘草二兩 凡十物以泔汁二斗煮得五升溫服八合日三服屬春

煮此令熟取汁一斗七升煮李根得七升汁内藥イ取三升分

方ホウ 生薑シヨウキヤウ一斤 半夏ホウシャ四兩シヨウ 洗アラ 桂心ケイシン三兩 人參ニンジン二兩 炙ヒツ 芩コウ 朮キョク

イヌチキナシムシ
忌生菜麵粘食
イヌチキナシムシ

集驗方黃芩伏苓湯治虛氣五歲不足寒中厥逆腹

滿氣賁衝胃より其し疾乍し起し色不し戴人し氣力し羸劣し復し起し

煮此令熟取汁一斗七升煮李根得七升汁內藥取三升

服五合日三夜再服廣洛方療賁氣在胸心迫滿支寧

方生薑一斤半夏四兩桂心三兩人參二兩吳茱萸

黃一兩甘草二兩各以水一斗煮取三升絞去滓分溫三服

忌生菜麵粘食

集驗方賁氣伏苓湯治虛氣五歲不足寒中厥逆腹

滿氣賁衝胃障發作氣欲絕不識人氣力羸劣小腹起

騰踊如狂子走下方生薑八兩甘草根白皮切一升生薑

五兩伏苓四兩半夏一升人參三兩甘草三兩當歸兩

芍藥二兩肥牡一頭升者逐走令口中沫出刺取血治此

如食法以水芝淹牡之熟煮之澄取清汁次去上肥得一

斗二升酒二升并血合煮諸藥取五升服八合日三升金方氣

治上下否塞不能休息破一氣丸方桔梗三升胡椒七升

枳殼十升橘皮三升干薑三升桂六分烏頭七分

人參五升桂心四升厚朴三升枳殼三升附子五升

甘草八升細辛三升亭歷四升大黃八升檳榔八升

伏苓四升前胡四升木六分防葵四分芎藭四分

當歸七分吳茱萸六分薑味丸如梧子圓服十九日二有

熱者空腹服之又云治氣上不得卧神秘方橘皮

生薑紫蘇人參五味子五味各等分五兩水七升

煮取三升分三服又云治氣滿腹脹下氣湯方半夏一升

生薑一升人參一兩半橘皮三兩四味切之以水七升

煮取三升分三服一日令盡

治淡飲方第七

病原論云淡飲者由氣脈閉塞津液不通水飲氣停

在胸脅者或成痰或成水其人素盛今更瘦人走復閉痰

生薑 紫蘇 人參 五味子 五味各等分 五兩 水七升

柴胡取三升分三服 又云治氣滿腹脹下氣湯方半夏一升

生薑一升 人參一兩半 橘皮三兩 四味切之以水七升

煮取三升分三服一日令盡

治淡飲方第七

病源論云淡飲者由氣脈閉塞津液不通水飲氣停

在胸府結而成淡又其人素盛今瘦水走腹間渡有

聲謂之淡飲其為病也胸脇脹滿水穀不消結在兩

脇水入腸胃動作有聲身體重多唾短氣好眠胸

背痛甚則上氣短逆倚息短氣不得卧其形如腫是也

南海傳云石寬淡飲關胃中垂數臍流清冰釋

糧糲洋咽開戶滿槍喉語聲不轉飲食不味動歷一旬如此之

而能蠲疾即醫明之大規矣氣不得卧其形如腫

是也

千金方云夫飲有四其人素盛今瘦水走腸間

有聲謂之淡飲下後水流在脇下欬逆引痛謂

之懸飲之水行歸於四支當汗出而不汗出身體重

之溢飲其人欬倚息短氣不得卧其形如腫謂之支飲

淡飲者當以藥和之懸飲者干棗湯主之甘草四兩

大棗廿枚干薑二兩三味水一斗煮取二升分三服

者青龍湯主之麻黃六兩桂枝二兩甘草二兩

石膏二兩杏仁廿枚大棗十枚生薑二兩凡七物以水九升

煮麻黃減二升乃內餘藥得二升去滓服一升溫覆令汗

出多者溫粉之汗止勿復服

支飲者本防已湯主之本防已三兩石膏雞子大十二枚

淡飲者當以藥和之懸飲者干棗湯主之甘草四兩

大棗廿枚干薑二兩三味水一斗煮取二升分三服

者青龍湯主之麻黃六兩桂二兩甘草二兩

石膏二兩杏仁廿枚大棗十枚生薑二兩凡七物以水九升

煮麻黃減二升乃內餘藥得二升去滓服一升溫覆令汗

出多者溫粉之汗止勿復服

之飲者本防已湯主之本防已三兩石膏雞子大十二枚

桂心二兩人參四兩四味水六升煮取二升分再服又云

伏苓湯主胸中澹滿方伏苓四兩半夏一兩生薑五

桂心八兩四味水六升煮取二升半分四服又云治卒

頭痛如破非寒又非中惡其病是胸中澹飲二三升

許通發暖飲二升須臾極吐一畢又飲如此數過刻

者須吐膿乃心不損人又云冬留飲冷癖法冬通

谷六五十粒在幽門下一寸幽門在巨關旁半寸錄驗方

治胸中澹飲食散在日併吐此方單服生薑汁一升

欲吐之不已吐自向下出也葛氏方治胸中多痰頭

痛不欲食及飲酒人乘僻道淡方恒山二兩甘草

一兩松蘿十兩蒺藜三七枚以酒水各一升半煮

取升半初服七合取吐之不盡餘更分二服後可服半

夏湯又方先作一升湯投一升水名為吐就湯乃食

三合塩以此易逆須臾欲吐便極出未盡更服二合

又云若胸中常有淡冷水飲虛羸不足取吐者方

方半升半煮一升洗生薑半斤伏苓三兩水七升煮取

一升半分再服小品方茱萸湯治胸中積冷心下淡水煩

滿行不下飲食心胸應背欲痛方生薑三兩半夏三兩

生心三兩吳茱萸三兩

夏湯又方先作一升湯投一升水名為生熟湯乃食
三合塩以此易遂須臾欲吐便極出未盡更服二合

又云若胸中常有淡冷水飲虛羸不足取吐者方
伏苓湯 半夏一升洗生薑半斤 伏苓三兩水七升煮取

一升半分再服 小品方茱萸湯治胸中積冷心下淡水煩
滿任不下飲食心胸應背欲痛方 生薑三兩半夏三兩

桂心三兩 吳茱萸三兩 人參一兩 大棗十枚 甘草一兩
凡七物以水九升煮取三升內白蜜五合分三服 今案集驗

方生薑五兩 胡洽方治淡冷癖氣方生薑八兩附子四兩
二物以水三升煮取一升半分再服 僧深方治五飲酒癖方

木一斤桂半斤 干薑半斤三物治下節和蜜丸如梧子服
十九不稍增初服當取下先食服日再 集驗方治胸中淡

飲腹中水鳴食不消食吐水湯水大櫛榔廿 半夏
八兩 生薑四兩 杏仁四兩梔木四兩伏苓五兩橘皮三兩切水一

斗煮取三升分三服 効驗方甘草丸治中飲方甘草二升
薇蒂一分凡二物治下節蜜丸如梧子欲下病服三九日三

丸不下增之以吐為度 又云斷草散治淡百病常
用驗方 七月七日薇蒂二枚赤小豆二兩人參二兩凡三物

治合下節以溫湯和服方寸匕當吐病愈
人參 又云斷草丸治胃中寒間有澀水方蜀附子一分梨蘆

一升 甘草一升 赤小豆一升 凡五物治合下節蜜丸
如小豆一服五丸當吐青黃不知稍增范汪方病久飲不得

息亭歷太棗寫肺湯主之方 亭歷 大棗
廿枚以水二升煮棗令得一升半去棗肉藥一丸復煎得

一升盡服之 極要方療淡氣方 橘皮二兩 以水三升
煮取一升分三服

支飲 支飲 支飲 支飲 支飲 支飲 支飲 支飲 支飲 支飲

支飲 支飲 支飲 支飲 支飲 支飲 支飲 支飲 支飲 支飲

支飲 支飲 支飲 支飲 支飲 支飲 支飲 支飲 支飲 支飲

支飲 支飲 支飲 支飲 支飲 支飲 支飲 支飲 支飲 支飲

支飲 支飲 支飲 支飲 支飲 支飲 支飲 支飲 支飲 支飲

支飲 支飲 支飲 支飲 支飲 支飲 支飲 支飲 支飲 支飲

支飲 支飲 支飲 支飲 支飲 支飲 支飲 支飲 支飲 支飲

支飲 支飲 支飲 支飲 支飲 支飲 支飲 支飲 支飲 支飲

支飲 支飲 支飲 支飲 支飲 支飲 支飲 支飲 支飲 支飲

支飲 支飲 支飲 支飲 支飲 支飲 支飲 支飲 支飲 支飲

支飲 支飲 支飲 支飲 支飲 支飲 支飲 支飲 支飲 支飲

支飲 支飲 支飲 支飲 支飲 支飲 支飲 支飲 支飲 支飲

一、又云新葶葶丸治胃事間有澀水方蜀附子一、和蘆
一、一、甘草一一、下赤小豆一一、下瓜丁一一、下凡五物治合下葶葶丸

如小豆一服五丸當吐青黃不知稍增范汪方病文飲不得

息亭歷太栗寫肺湯主之方亭歷

廿枚以水二升煮棗令得一升半去棗內藥一丸復煎得

一升盡服之極要方療淡氣方橘皮二兩

煮取一升二合為一服間日服之新錄方治淡飲方苦瓠穰

赤小豆一、下楊蔞蜜丸飲服如小豆三九大佳又方瓜丁

赤小豆各一兩楊蔞蜜丸飲服如小豆七九吐淡美

治癖食方第八以鹽久宿食不消也又腹病也

病源論云夫五藏調和則營衛氣重理營衛氣重則

津液通流難復多飲水漿不能為病橘養市方三

雖否滯三雖不澤則腹胃不能宣行因飲水漿便令

停滯不能行更遇寒氣即聚而成癖者謂癖側在於

兩脇之間有時而痛是也通玄玄癖之疾不專於一

病者肝之所生癖病者脾之所成生於左癖成於右者

如弓之弦肝之所生肝與膽為清淨之府不受外邪故知自

生病也癖者脾胃為水穀之海食不消偏僻一偏故名

為癖令一弦癖同為一疾實難矣

龍門方治弦癖病腹堅如石方

取苦瓠開口盛大散醋滿中蜜塞口釜中煮令

極熱出瓠以熨堅處冷即更煮時即作葱豉

湯食之每熨時皆以衣觀身

極要方治癖方龍門方白木六分枳殼六分生薑

八分大黃十分前胡四分右以水六升煮取一升六合分溫

龍門方治絞痛病腹堅如石方

取苦瓠開口盛大散醋滿中密塞口釜中煮令

極熱出瓠以熨堅處冷即更煮之時即作葱豉

湯食之每熨時皆以衣觀身

極要方治癰瘰方

龍甲六分一名青衣白朮六分一名白朮枳殼六分一名枳殼生薑

八分一名生薑前胡四分一名前胡右以水六升煮取一升六合分溫

三服忌猪魚

千金方治心淡蔭癖氣吞酸

半夏湯方 半夏三兩 生薑六兩 附子一枚 吳茱萸

三兩 四味水五升煮取二升半分三服

葛氏方治腹中冷癖水穀瘕結心下停淡雨脇痞滿

案之鳥轉運空飲食方 大黃三兩 甘草二兩 蜜一升二合

棗廿七枚以水三升煮棗取升內諸藥煮取一升七合分

再服又方伏苓一兩 茱萸三兩 櫛櫞丸如梧子服五九三

醫門方療瘕氣冷痛吐酸水或目出熱契水得

此病方水乾薑各二兩 橘皮細辛 吳茱萸各一兩 伏苓

人參各二兩半 右搗篩蜜和為丸空腹煖水下十五丸加至

廿九日二

廣利方理癰氣腹痛兩脇脹滿食少方 紫胡六分

桔梗八分 通草八分 伏苓六分 赤芍藥四兩 栝李人四

龍甲四分 切以水二大升煎取九合食後分溫三服如人行七

里進一服忌生冷人寬 廣濟方療癰結心下硬痛也豆丸方

巴豆三枚 杏仁七枚 大黃如鷄子大 搗篩蜜丸空腹以飲服如

梧七丸日一服

治胃及吐食方第九

病源論云胃及老營衛俱虛其通氣不足停水積飲在胃

龍甲カクコ切以水三大升煎取九合食後分溫三服如人行七

切又作カクコ八里進一服思生令人寬カクコ廣濟方療癰結心下硬痛也豆丸方

巴豆三枚杏仁七枚大黃如雞子大棗節蜜丸空腹以飲服如

陶景注云巴豆出巴郡
似大豆
一名巴豆
梧七丸日一服

治胃及吐食方第九

病源論云胃及老營衛俱虛其通氣不足停水積飲在胃

管則藏冷而脾カクコ不磨則宿穀不化其氣逆而成胃及也

則朝暮吐暮食朝吐心下牢大如杯往カクコ寒熱甚者食

已即吐也

醫門方云食已吐其食者胃中虛冷所致

効驗方干薑丸胃及大吐逆胸痛羸瘦不得食飲溫中

下氣使人進食方 吳茱萸二兩 小麥二兩 杏仁二兩

干薑二兩 好豉二兩 蜀椒二兩 凡六物槵下篩

和蜜丸如梧子服七丸日三 葛氏方治胃及不受食之畢

輒吐出方 大黃四兩 甘草二兩 水三升煮取一升半分再服之

陳者謂僧深方治胃及吐逆不安穀枳子湯方 陳枳子一枚 緩豉一升

茱萸五合 三物枳茱萸合治為散以水二升半煮豉三

四沸漉去滓汁著銅器中乃火散如鷄子擘合和合頓服之

羸人再服 經心方伏苓湯治胃及而渴方 伏苓四兩 澤瀉

四兩 桂心二兩 半夏四兩 甘草二兩 五味以水一升煮取二升半服

八合日三又云治胃及食輒吐方 陽粟米令極白棗節下作丸

楮子大棗者稍吞得下便愈 范汪治胃及不受食已飲吐

四物常歸湯方 白蜜一升 當歸二兩 人參二兩 半夏一升 凡

四物咀咀以水二斗合蜜楊百卅過內藥銅器中煎得六升分

并服加至一時復服盡又云橘皮湯治嘔吐及逆食飲不下方

四兩桂心二兩半夏四兩 甘草二兩 五味以水一斗煮取三升半服

八合日三又云治胃及食輒吐方 粳米令極白棗節下作丸

楮子大棗者稍吞得下便愈 此汪治胃及不受食已欬

四物常歸湯方 白蜜一升 當歸二兩 人參二兩 半夏一升 凡

四物^此以水二斗令蜜楊百卅過內藥銅器中煎得六升

并服至一時復服盡又云橋皮湯治臨吐及逆食飲不下方

人參一兩 橋皮二兩 白朮一兩 生薑三兩 甘草二兩 凡五物切

以水一斗煎取三升先食服一升日三

千金方治大虛胃及食下難便吐方 人參一兩 澤瀉二兩

茯苓四兩 橋皮三兩 桂心三兩 干薑三兩 青竹茹五兩 大薑

六分 九朮水八升煮取三升服七合日三夜一已利者去者

大黃又方蘆根茅根以水四升煮取二升頓服下得

食 今案新錄方切各一升水六升 又云冬胃及食吐方

冬雨乳下各一寸以卷為度 又方冬吞上一寸廿

壯又方冬胃管穴千壯在鳩脊中央 極要方療吐不

得食并胃及飲逆食即吐方 甘草一兩 橋皮一兩 生薑

八兩 葱白干四枚 右以水六升煮取二升半分三服不心

更作 今案廣濟方葱白十莖橋皮以 醫門方療胃及不受食

訖臨吐方 半夏人參 生薑 橋皮二兩 大棗十二枚 白

蜜五合以東流水七升煮取二升半去滓內蜜更送三百下

煎三五沸分溫三服相去八九里 救急單驗方療及胃方

鳩生葛根紋汁二升服驗 今案新錄方取六七合日二三 非治胃熱逆不下食者

又云方冬雨乳下三寸扁鵲云隨年壯華他云壯壯神驗

治宿食不消方第十

病原論云宿食不消者由五藏氣虛寒氣在於脾胃之

蜜五合以東流水七升煮取二升半去滓內蜜更送三百下

煎三五沸分溫三服之相去八九里救急單驗方療及胃方

鳩生葛根紋汁二升服驗

今案新醫方取六七合日二三服治胃熱逆不下食者

又云方灸兩乳下三寸扁鵲云隨年壯華他云壯神驗

治宿食不消方第十

病原論云宿食不消者由五藏氣虛寒氣在於脾胃之

間故使穀不化也舊穀未消新穀又入脾氣既弱故不能磨之

則經宿而不消也令人腹氣急意氣酸鼻時復面寒

壯熱是也或頭痛如瘧之狀集驗方治凡所食不消方

取其餘類燒作末酒服方寸匕便去宿食即差陸光錄

說有人食桃有不消作病時已晚無桃就樹間得燒桃子

燒服之登出病即差

小方同之

南海傳云若疑腹有宿食

又刺膺胃宜頃恣飲熱湯指剔喉中變法令盡

更飲更次以盡為度或飲冷水理亦无傷或干薑

湯斯甚妙也其日必須斷食明朝方始進食

范汪方治腹痛消穀心利服大豆方

取大豆苗擇兒好者服一合所日四五服一日中五合飯後

輒服雖非飯後可投間服趣盡四五合欲服時手按豆

令烟光明若苦堅難小減豆

范汪方治食生冷之物或寒時衣薄當風食不消或夜食以

卧不消化心腹煩痛脹急或連日不化方燒地令熱以褥席

布上卧上厚覆取汗愈

方同之

新錄方治宿食不消方雞白

切一升豉一升水四升煮取二升分二服又方主薑五大兩鳩取汁溫

服之又方鳩絲如泥酒服如棗日三又方麴米干薑末一升酒

服一方寸匕日三又方灸大倉穴二三百壯又方灸膺左右相去

范汪方治食生冷之物或寒時衣薄當風食不消或夜食以

卧不消化心腹煩痛脹急或連日不化方燒地令熱以褥

布上卧上厚覆取汗愈葛氏方同新錄方治宿食不消方雞白

切一升豉一升水四升煮取二升分二服又方主薑五兩梔取汁溫

服之又方梔絲如泥酒服如棗日三又方麴米干薑末一升酒

服一方寸匕日三又方灸大倉穴二百壯又方灸膺左右相去

三寸名魂舍並依年壯准多益佳又方灸第五椎并左

右相去一寸五分

錄驗方治宿食不消大便難練中丸方大黃六分亭歷子

四兩熬杏仁四兩熬芒消四兩熬凡一切下痢蜜和食已服如

梧子七九日三不知稍增一名石肺又石脾

千金方消食丸主數年不能食方麥蘗一升薑四兩

烏梅四兩七月七日麴一升四味蜜和服十九日再至丸寒

在胸中及胃煩也者皆差極要方治宿食不消

心腹妨滿脹痛須利方訶梨勒皮八卜桔梗六分檳榔八

分藥六分大黃十八分右為散空腹煮生薑飲服三錢上日

二服

葛氏方治脾胃氣弱穀不得下遂成不復受食方

大麻子人一升大豆黃卷二升并一名苽熬令黃香梔飲服

一二方寸匕日四五今案僧保方大麻子人三升大豆

治寒冷不食方第十一

千金方消食餅下丸寒冷者常將之方麴米一升大麥

蘗一名苽一升吳茱萸四兩三味蜜和服十五丸如梧子日三

次云消食丸主數年不能食方小麥蘗一升

干薑四兩烏梅四兩麴一升四味蜜和服十九

一二三...
二升調中下氣調冷熱利水散

治寒冷不食方第十一

千金方消食餅下丸寒冷者常將之方 麴米一升大麥

蘗米一升 吳茱萸四兩 三味蜜和服十五丸如梧子日三

次云消食丸主數年不能食方 小麥蘗一升

干薑四兩 烏梅四兩 麴一升 四味蜜和服十丸

日再至卅丸寒在胃中及胃番心者時差

范汪方治久寒不欲飲食數十歲方 茱萸八合生薑一斤

消石一升 凡三物清酒一升水五合煮令得四升絞去滓

溫飲二升病即下止勿復服也 葛氏方治胃中虛冷不能

飲食輒不消羸瘦腹脹之四支極弱百疾自此牙生方蘗白

斤枳實三兩 橘皮一兩 大棗十二枚 粳米二合豉七合以水

七升先蘗得五升內諸藥煮取二升分三服日作之

廣濟方療冷熱不能食及少氣調中丸方人參五兩伏

苓五兩 甘草五兩 白朮五兩 乾薑四兩 梔子以蜜和丸空

腹溫酒服如梧子卅九日二夜不飲酒者大棗飲下

錄驗方治惡食人參湯方 人參四兩 生薑二斤厚朴二兩

枳實二兩 甘草二兩 凡五物切以水六升煮取二升分三服

集驗方治久寒胸脇逆滿不能食吳茱萸湯方吳茱

萸一升 人參一兩 生薑八兩 小麥一升 甘草一兩 桂心一兩

半夏一升 大棗枚 凡八物咀以清酒五升水三升煮

取絞去滓適寒溫飲一升日三

治上熱下冷不食方第十二

耆婆方治人上熱下冷淡飲風氣虛勞方 獨活伏苓

白朮澤瀉厚朴黃耆升麻高本紫菀 甘草人參黃芩 梔子

生薑三兩 橘皮一兩 右十四味切以水一斗煮取

更升人參一兩生薑八兩小麥一升甘草一兩桂心一兩
半夏一升大棗枚擘凡八物咀咀以清酒五升水三升煮

取絞去滓適寒溫飲一升日三

治上熱下冷不食方第十二

者安方治人上熱下冷淡飲風氣虛勞方 獨活伏苓

白木澤瀉厚朴厚朴者甘麻高本紫苑甘草人參黃芩一名黃芩

生薑三兩 橘皮一兩 右四味切以水一斗二升煮取

三升去滓分三服又云自飲酒上熱下冷不能食方人參

甘草二升升麻二兩干薑二兩粟米一合凡五味切以水六升

煮取米去滓分三服又方平旦空腹服真酪一合即愈

又方常食粟食及粟粥之又云治虛上熱下冷氣上頭痛

痛胃煩人參湯方人參二兩伏苓三兩麥門冬一兩

粟二兩凡四物水七升煮取四升分三服日三夜二

又云治內虛上熱下冷氣不下頭痛胸煩頭眩

湯方 豉一升水二升一方三升今小沸內豉令三沸頃

時有驗 僧深方茱萸丸治事上冷事下熱宿食滯

飲積食不消寒在胸中或及胃宮食痛瘦方 茱萸

二兩升一兩半 黃芩一兩 前胡一兩 細辛六分 白芷二枚人參

三升 伏苓一兩半 附子一兩 干薑六分 半夏一兩 凡十一物

下篩丸以蜜服如梧子三九日三不知稍增之 廣濟方療脾上

熱脾下冷日西身體熱疼輒食不下夜卧不安方 苦參

六分 龍膽五分 芍藥四分 黃連六分 枳殼四分

青蘘子五分 大黃二分 黃芩四分 枳殼二分 芒硝二分

枳殼蜜丸每食後以飲服丸如梧子十四九日二

治穀勞歌即方第十三

病源論云穀勞者脾胃虛弱不能傳消穀食使府藏氣

下痢丸以蜜服如梧子三九日三不知稍增之廣濟方療脾上

熱脾下冷日而身體熱疼輒食不下夜卧不安方苦參一名水槐

六分龍膽五分味甚苦故以膽為名芍藥四分黃連六分一名為服枳殼四分

青蘗子五分大黃二分黃芩四分枳殼二分一名為服芒硝二分

轉節蜜丸每食後以飲服丸如梧子十四九日二

治穀勞欲卧方第十三

病源論云穀勞者脾胃虛弱不能傳消穀食使府藏氣

否眠是也葛氏方治飽食竟便卧得穀勞病令人四

支塞也其狀令人食已則卧支體煩重而嗜眠是也

葛氏方治飽食竟便卧得穀勞病令人四支煩重

欲卧食畢輒甚方大麥蘗一斤今案范汪方大麥蘗一斤枳一兩干薑三兩枳二升干薑三兩也枳實一升

照方寸匕日三四服又云治食過飽煩悶

俱欲卧而腹脹方枳麥麵今案范汪方大麥蘗一斤今薇香枳服方寸匕得麥大

麵益佳無麵者蘗可用

新錄方治穀勞食竟即目而睡方以酢二升煎杏仁

五十枚取一升服之覆取汗又方食傷飽為病胃

脹心滿者方冬胃管七枚又方十沸湯半水若三

升飲之當吐食出

治惡方第十四

病源論云惡心者心下有停水積飲所為則心裏澹澹然

欲吐為惡心

千金方治惡心方苦瓠一名苦瓠并一升切漬水三升煮取一升

頓服頃更吐并下如瓠一名車前草衣三升葛氏方治人忽惡心不

已方雖白半斤柴萸一兩一名車前草豉半升米一合棗四枚枳實二枚

盧如彈丸水三升煮取一升半分三服又方但多爵一名車前草豉

子及散賓郎一名車前草下

徒監徒敢三反
水搖也謂水中
水柱動也

二カヒモク多ク
名歌集
七不

如瑕瑣衣三升。葛

雄白半

上音豆下呼候友

椰菜

新錄方

生薑

欺心方

カスミカサ
吳米南

去滓肉

以三五日

息酢方第十五

病

吸氣息

臭

月
之

千金

通服

人參

水六升

有殊

廣渚方

檳榔

通利小便。二豆豉。醫以方瘕食意。耳。方。黃。二。兩。

人參二兩。吳茱萸二兩。生薑三兩。大棗十二枚。橘皮一兩半。切。以

水六升。煮取二升。去滓。分溫二服。又云。瘕食後。吐酢水。食養

飯粥。並作方。厚朴。吳茱萸。橘皮。白朮。三兩。

右。搗。篩。為。散。空。腹。溫。酒。服。方。寸。匕。甚。効。

廣濟方。瘕。吐。酸。水。每。食。即。變。作。酸。水。吐。出。方。

檳榔人十二。六。人參六。六。伏苓八。八。橘皮六。八。畢拔。

六。八。搗。篩。為。散。平。晨。空。腹。取。生。薑。五。大。兩。合。皮。搗。絞。

取。汁。溫。內。散。方。寸。匕。梔。調。頓。服。之。且。服。漸。加。至。一。匕。

半。若。利。多。賦。以。炭。洩。為。度。忌。生。冷。油。膩。猪。臠。

効驗方。治。食。後。吐。酢。水。洗。如。酢。漿。食。養。即。刻。為。胃。瘕。

干薑散方。食。茱萸一兩。干薑一兩。朮一兩。甘草一兩。凡。四。

物。治。下。節。用。酒。若。湯。服。方。寸。匕。日。三。

治。瘕。出。方。第。十。六。

病。疸。論。云。瘕。吐。者。皆。由。脾。胃。虛。弱。受。於。風。邪。所。為。也。若。風。

邪。在。胃。則。瘕。胃。間。有。停。飲。胃。內。有。久。寒。則。瘕。而。其。

伏。長。太。息。心。裏。澹。然。或。煩。滿。而。大。便。難。或。唐。泄。並。其。後。故。

養生方。云。八。月。勿。食。被。霜。菜。向。冬。發。瘕。及。溫。之。病。食。飲。吐。或。

心。停。不。消。或。為。反。胃。槌。要。方。瘕。瘕。吐。此。病。有。兩。種。一。者。積。

熱。在。胃。瘕。送。不。下。食。二。者。積。冷。在。胃。瘕。送。不。下。食。若。是。積。

熱。在。胃。瘕。送。宜。依。合。生。薑。根。等。五。味。飲。服。之。生。薑。根。切。一。升。

生。麥。門。冬。一。升。青。竹。茹。一。升。生。薑。切。五。合。伏。苓。五。兩。右。切。以。

水。八。升。煮。取。二。升。半。去。滓。加。竹。瀝。六。合。梔。調。分。二。服。

博。濟。安。衆。方。治。瘕。送。不。食。方。厚。朴。三。兩。去。皮。薑。人。參。

一。兩。橘。皮。一。兩。右。水。三。升。煎。取。一。升。分。作。三。服。飯。後。服。

僧。深。方。生。薑。湯。治。食。吐。送。方。生。薑。五。兩。伏。苓。四。兩。

熱在胃。臨送。宜依合生薑根等。五味飲。服之。生薑根切。升

生。麥門冬。一升。青竹茹。升。生薑切。五合。伏苓。五兩。右切。以

水八升。煮取二升半。去滓。加竹瀝六合。攪調。分三服。

博洛安衆方。治臨送不食方。厚朴三兩。去皮。薑人參

一兩。橘皮一兩。右水三升。煎取一升。分作三服。飯後服。

僧深方。生薑湯。治食也。吐逆方。生薑五兩。伏苓四兩。

半。及一升。橘皮一兩。甘草二兩。五種水九升。煮取三升。七合。

分三服。廣濟方。療脾胃中冷。氣每食即臨吐方。

人參二兩。甘草一兩半。橘皮一兩半。橘皮一兩半。

葱白三兩。生薑三兩。切。以水七升。煮取二升三合。飯去滓。分

溫三服。忌生油。臘猪鼻。海藻。范汪方。半。及湯。治胃中乏

氣。而欲飲死方。人參二兩。伏苓二兩。生薑三兩。白蜜五合。

半。洗。凡五物。以蜜肉六升。水中。燒之。百過。以餅藥合。

投中。煮得三升。分四服。禁食。治干飲。之用此。醫門方。治

臨送。變。去。食。飲。不。下方。橘皮二兩。木二兩。生薑三兩。

人參二兩。甘草二兩。右切。以水七升。煮取二升半。溫三服。相

去八九里。止飲。橘皮湯方。橘皮二兩。干薑二兩。人參一兩半。

以水六升。煮得二升。服七合。日三。新錄方。治臨吐。不下。食方。

錄驗方。治臨吐。區方。蘆根。茅根。切。各一升。以水六升。煮取二升。

分三服。曾氏方。治卒臨吐。又厥逆方。生薑斤。切。橘皮

四兩。水七升。煮取三升。遍寒。溫服一升。日三。千金方。云。諸臨

歲。心下。堅。痞。其。間。有。水。淡。眩。悸。者。小。半。湯。主。之。半。復

一升。生薑八兩。伏苓三兩。三味。水七升。煮取二升半。二服。又云。凡

飲者。多。食。生。薑。此。是。飲。家。聖。藥。也。又。云。飲。飲。吐。方。生。乾

湯。二升。頓服。即吐。又云。飲。飲。吐。方。生。乾。湯。二升。頓服。即吐。

湯。二升。頓服。即吐。又云。飲。飲。吐。方。生。乾。湯。二升。頓服。即吐。

湯。二升。頓服。即吐。又云。飲。飲。吐。方。生。乾。湯。二升。頓服。即吐。

人三服 葛氏方治卒溫症 又厥逆方生薑斤切棗

四兩水七升煮取三升過寒溫服一升日三千金方云諸飲

歲心下堅痞其間有水淡眩悸者小半夏湯主之 半夏

一升生薑八兩伏苓三兩 三味水七升煮取二升半二服又云凡

飲者多食生薑此是飲家聖藥也 又云飲飲吐方生乾

湯二升頓服即吐 又云飲吐渴者心俞百壯又方灸

臑俞百壯又方灸胃管百壯又方原關五十壯又方灸

胃管百壯三報 又方灸脾募百壯三報

治干溫方第十七

病臣論云干溫者胃氣逆故也但溫而欲吐而無所出

故謂之干溫 僧深方治胃逆乾飲飲吐無所去人參湯

人參二兩干薑干薑四兩 澤瀉二兩桂心二兩甘草二兩

伏苓四兩 大黃一兩八物以水八升煮取三升服八合日三

又云茱萸湯治干飲吐涎沫煩心頭痛方茱萸半升

大棗十枚人參三兩 生薑六兩凡四物以水六升煮取二升

五合日三服又方茱萸一升大棗十二兩以水七升煮取二升半分

三服又方半夏干薑八等為散服方寸匕又方生薑

汁五合蜜四合二物先煎蜜減一合竟投薑汁復煎

數沸稍啜之 啖之勿久則口強不可啖

范汪方治卒飲煩悶方用甘蔗搗之取汁溫服一升日三

集驗方干飲或歲手足逆冷方橘皮四兩生薑

六兩切以水六升煮取三升服一升 葛氏方治干溫

不息方檉葛根絞汁服一升許 又方灸兩手腕後兩筋

中先夫名間使各七壯

又千金方治干飲歲厥方飲新水三升又方煮頭

達敢及合辰也

范汪方治卒^干飲煩悶方用甘蔗搗之取汁溫服一啗三

集驗方治干飲或歲手足痿癱方九橘皮四兩生薑

六兩切以水六升煮取三升服一升考千金方葛氏方治干臨

不_レ息方 鵝_レ葛根絞汁服一升許 又方 灸兩手腕後兩筋

中先夫名間使各七壯

孫思邈曰一夫者以四指
爲一手夫又以肌肉爲
理爲解又千金一
錢人買死曰之中

又千金方治千飲シヤク歲セウ厥方運飲新シヤク級水クヰ三升又方煮頭コウ

三升飲汁又方濃煮三斤蘆根飲汁又方空腹飲

生薑汁又云炙干監方
炙心主尺澤亦佳
今案明堂云
在肘中膊上

又方灸乳下一寸廿壯

治歲方第十八

於越反

病源論云。歲者脾胃俱虛。受於風邪。故令新穀入

胃不能傳化故穀之氣與新舊相干胃氣則逆

胃脹こゝ氣逆目遇冷析之也

葛氏方治卒宛不止方
飲新汲井水數斗

肥井華

又方但胸氣忪_ツ又方痛_ツ爪眉中央_ツ胸氣_ツ

又方好豉二升煮取汁飲之又方枇杷葉一斤水斗

煮取三升并服又方煮蘆根之佳
今案千金方濃煮三升飲汁

又方以物刺鼻中若以少許皂莢內鼻中令嚏即止嚏

錄驗方治飲歲橘湯方生薑兩橘皮一兩甘草兩凡三物

以水六升煮取二升一服七合日三
新錄方治冤方

單服十沸湯任多少又方生薑五大兩合皮槁取汁脹

又方茯苓切二升水四升煮取一升五合稍啗之

又方橘皮五兩以水三升煮取一升二三服又方吳茱萸

下一寸 又各胃管穴 蘇軾本草注治宛方千歲

薑汁ヤブコウジ雀巢錫食經ヤブコウジ暑ヤブコウジ預為粉和薑汁ヤブコウジ作粥食之小

金馬方...
生薑...
...
...

以水六升煮取二升一服七合日三
新錄方治宛方

單服十沸湯任多少又方生薑五大兩合皮槁取汁脹

又方荻根切二升水四升煮取一升五合稍咽之

又方橘皮五兩以水三升煮取一升二三服又方炙核

下一寸又方胃管啖 蘘菹本草注治宛方千歲

蘘汁崔禹錫食經暑熱為粉和蘘汁作粥食之小

品方治宛方炙腋下蕞毛中五十壯又方炙石南

空五十壯 千金方治宛方 炙桑上漿炷如麦七壯

又方炙脊下四寸七壯 又方煮豉三升飲汁

又方空腹飲姜汁一升

醫心方卷第九